

KİMYA TARIM ÜR. PAZ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ●

nevagri



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Product Catalog



Компания была создана в Анталии с целью производства и сбыта продуктов питания для растений.

Наша компания производит химические удобрения, органические удобрения и удобрения в соответствии с потребностями аграрного сектора.

Также мы производим органо-минеральные удобрения.

Следя за инновациями в сельскохозяйственном секторе: уаша компания придает большое значение исследованиям и разработкам.

Исследуя инновации в сельскохозяйственном секторе мы работаем над улучшением наших рецептов.

Источником нашей силы, которая позволяет нам добиваться устойчивого прогресса, является наша корпоративная политика качества.

Для получения подробной информации и других наших продуктов, пожалуйста, посетите наш сайт.



РЕКОМЕНДАЦИИ

- Внимательно прочтите этикетку.
- Храните вдаль от детей, домашних животных и продуктов питания.
- Никогда не превышайте соответствующие дозы и используйте только при необходимости.
- Пожалуйста, используйте во время нанесения удобрений маску, перчатки и очки.
- Избегайте попадания в глаза, на лицо и на кожу. В случае попадания немедленно промойте большим количеством воды.
- Не используйте использованную пустую упаковку для других целей, уничтожьте ее.
- Рекомендуется использовать после анализа почвы и/или листьев.

ВНИМАНИЕ:
НЕ ПРИМЕНЯТЬ В ПОЧВЕ, ДОСТУПНОЙ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ.
НЕЛЬЗЯ ВЫПАСАТЬ ИЛИ ОСТАВЛЯТЬ ЖИВОТНЫХ В ТЕЧЕНИЕ МИНИМУМ 21 ДНЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ.
СКОШЕННУЮ ТРАВУ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КОРМЛЕНИИ ЖИВОТНЫХ.

ЧТО СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ХРАНЕНИИ:
ISABION можно смешивать со всеми удобрениями, хелатами и большинством средств защиты растений. Его не следует смешивать более чем с двумя другими продуктами. Следует избегать смешивания с минеральными маслами и нитропроизводными, такими как DNOС. Можно без риска применять баковую смесь с медьсодержащими фунгицидами на оливах, зерновых и луке. При использовании баковых смесей с соединениями серы и меди следует провести предварительные испытания на целевой культуре и проследить за реакциями, которые могут возникнуть в течение нескольких дней после внесения. Это следует делать через 3-4 дня после применения соединений меди.



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

НАЗВАНИЕ РАСТЕНИЙ	ПРИМЕНЕНИЕ	ВНЕКОРНЕВАЯ ПОДКОРМКА
ФИСТАШКА	Перед цветением, в период опадания лепестков и плодоношения	250 мл/100 л воды
ГРУША	До цветения, когда опадают лепестки, в период плодоношения и когда плоды достигают 6-7 см в диаметре	200-300 мл/100 л воды
ЯЧМЕНЬ	С фазы 4-5 листьев до конца кущения и 2 применения после кущения	300-500 мл/га
ПОДСОПЧЕЧНИК	На стадии 3-4 листьев и перед цветением, 2 применения	300-500 мл/га
АЛЫЧА	До цветения, когда опадают лепестки, в период плодоношения и когда плоды достигают 6-7 см в диаметре	200-300 мл/100 л воды
МИНДАЛЬ	Перед цветением, во время опадания лепестков и во время плодоношения	250 мл/100 л воды
ВИНОГРАДНИК	Перед цветением, когда опадают лепестки и во время изменения цвета плодов	250-300 мл/100 л воды
ГОРОХ	До цветения, 3 применения с интервалом 10-15 дней после цветения	200-300 мл/100 л воды
ПЕРЕЦ (полевой)	Периоды до цветения, плодоношения, созревания плодов	250-300 мл/га
ПЕРЕЦ (тепличный)	Периоды до цветения, плодоношения, созревания плодов	250-300 мл/100 л воды
ПШЕНИЦА	С фазы 4-5 листьев до конца кущения и после кущения - 2 применения	300-500 мл/га
ТРЕЩЕЦКИЙ ОРЕХ	С фазы 4-5 листьев до конца кущения и после кущения - 2 применения	250 мл/100 л воды
РОЖЬ	С фазы 4-5 листьев до конца кущения и после кущения - 2 применения	300-500 мл/га
ПАДДИ	2 применения в период кущения и цветения.	1.применение: 400-500 мл/га 2.применение: 500-600 мл/га
КЛУБНИКА (полевая)	За 20-30 дней до цветения, за 3-5 дней до завязывания плодов, каждые 20 дней до конца производственного сезона	200-250 мл/га
КЛУБНИКА (ТЕПЛИЦА)	За 20-30 дней до цветения и в начале вегетативного развития перед зимой спячкой, за 3-5 дней до завязывания плодов, каждые 20 дней до конца производственного сезона	200-250 мл/100 л воды
ТОМАТ (полевой)	Периоды до цветения, плодоношения, созревания плодов	250-300 мл/га
ТОМАТ (теплица)	Периоды до цветения, плодоношения, созревания плодов	250-300 мл/100 л воды
ЯБЛОКО	До цветения, когда опадают лепестки, в период плодоношения и когда плоды достигают 6-7 см в диаметре	200-300 мл/100 л воды
АРТИШОК	Через 3 дня после посадки и 4 применения через каждые 15-20 дней	200-300 мл/100 л воды
ЭРИК	До цветения, когда опадают лепестки, в период плодоношения и когда плоды достигают 6-7 см в диаметре	200-250 мл/100 л воды
ФАКОЛЬ	До цветения, 3 применения с интервалом 10-15 дней после цветения	300 мл/100 л воды
ФУНДУК	До цветения, при опадании лепестков и во время плодоношения	250 мл/100 л воды
ТРЕПЕПОРТ	Вегетативное развитие и прорастание, когда листья опадают, в период плодоношения и когда плоды достигают 6-7 см в диаметре	200-300 мл/100 л воды
МОРКОВЬ	Когда корни достигают размера карандаша, 3-4 применения каждые 2-3 недели	300-400 мл/га
ОГУРЕЦ (полевой)	Периоды до цветения, плодоношения, созревания плодов	300 мл/га
ОГУРЕЦ (ТЕПЛИЧНЫЙ)	Перед цветением, закладкой плодов, периодами созревания плодов	100-250 мл/100 л воды
ШПИНАТ	Применение каждые 20 дней, начиная с 15-20 дней после посева	250 мл/га
ТЫКВА (полевая)	4-5 листьев; до цветения, завязывания плодов, периоды созревания плодов.	300 мл/га
ТЫКВА (теплица)	4-5 листьев; до цветения, завязывания плодов, периоды созревания плодов.	100-250 мл/100 л воды
АРБУЗ (полевой)	4-5 листьев; до цветения, завязывания плодов, периоды созревания плодов.	300 мл/га
АРБУЗ (теплица)	4-5 листьев; до цветения, завязывания плодов, периоды созревания плодов.	100-250 мл/100 л воды
ДЫНЯ (полевая)	4-5 листьев; до цветения, завязывания плодов, периоды созревания плодов.	300 мл/га
ДЫНЯ (теплица)	4-5 листьев; до цветения, закладкой плодов, периодами созревания плодов.	100-250 мл/100 л воды
АБРИКОС	Перед цветением, когда опадают лепестки, в период плодоношения, когда плоды достигают 6-7 см в диаметре.	200-250 мл/100 л воды

ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ ЖИДКОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ, СОДЕРЖАЩЕЕ АМИНОКИСЛОТЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

LISABLAN

ГАРАНТИРОВАННЫЙ СОСТАВ	% М/М
Общее органическое вещество	%60
Органический азот	%9
Органический углерод	%28
Свободные аминокислоты	%11
pH	5,5 - 7,5

НАЗВАНИЕ РАСТЕНИЙ	ПРИМЕНЕНИЕ	ВНЕКОРНЕВАЯ ПОДКОРМКА
СЕЛЬДЕРЕЙ	Вносить каждые 20 дней, начиная с 10-15 дня после посева.	250 мл/га
КАШТАН	До цветения, в период опадания лепестков и завязывания плодов.	250 мл/100 л воды
ВИШНЯ	До цветения, при опадании лепестков, в период плодоношения, когда плоды достигают 6-7 см в диаметре.	200-250 мл/100 л воды
КИВИ	Вегетативное развитие и до цветения - При опадании лепестков, в период плодоношения и когда плоды достигают 6-7 см в диаметре.	150-200 мл/100 л воды 250-300 мл/100 л воды
РАПС	Во время образования боковых ветвей и укоренения стебля - 2 обработки.	200 мл/га
СЕМЕРСТВО КАПУСТНЫЕ	После посева и двух высеиваний с интервалом 20 дней.	250-300 мл/га
ПИАМОН	Перед вегетативным развитием и цветением - когда опадают лепестки и в период плодоношения и когда плоды достигают 6-7 см в диаметре.	200-300 мл/100 л воды
МАНДАРИН	Перед вегетативным развитием и цветением - во время опадания лепестков, в период плодоношения и когда плоды достигают 6-7 см в диаметре.	200-300 мл/100 л воды
САБАТ-ПАТУК (полевой)	Применение каждые 20 дней через 10-15 дней после всхода.	250 мл/га
ПАТУК (тепличный)	Применение каждые 20 дней через 10-15 дней после всхода.	200 мл/100 л воды
ПЕТРУШКА	Когда корни становятся размером с карандаш, 3-4 применения каждые 2-3 недели.	250-300 мл/га
ЧЕЧЕВИЦА	Через 25 дней после посева, 3 применения с интервалом 15 дней.	250-300 мл/га
КУКУРУЗА	Через 25 дней после посева, 3 применения с интервалом 15 дней.	250-300 мл/га
БАНАН	2-4 применения с интервалом 12-14 дней в критические периоды, такие как цветение, опадание и образование плодов, изменение цвета, заморозки (используйте меньшую дозу на молодых растениях в возрасте 1-2 лет).	250-350 мл/га
НАР	Перед цветением, когда опадают лепестки, в период плодоношения, когда плоды достигают 6-7 см в диаметре.	200-250 мл/100 л воды
НЕХТАРИН	До цветения, когда опадают лепестки, в период плодоношения, когда плоды достигают 6-7 см в диаметре.	200-250 мл/100 л воды
НУТ	Через 25 дней после посева, 3 применения с интервалом 15 дней, 3 применения до и 3 применения после цветения при наличии 3-4 листьев.	250-300 мл/га
КЛОПОК	Когда растения достигнут 15 см, когда корни станут размером с карандаш, через 15 дней.	200-300 мл/га
КАРТОФЕЛЬ	До цветения, во время плодоношения, в период созревания плодов.	200-300 мл/га
БАКАЖАН (полевой)	Плодоношение до цветения и во время созревания плодов.	250-300 мл/га
БАКАЖАН (теплица)	Применять каждые 20 дней, начиная через 10-15 дней после посева.	250-300 мл/100 л воды
ЛУК-ПОРЕЙ	До вегетативного развития и цветения - в период плодоношения, когда листья опадают, а плоды достигают 6-7 см в диаметре.	200 мл/га
АЛПЕСИН	Баковая смесь с соединениями меди каждые 20 дней после начала формирования клубней.	200-300 мл/100 л воды
ЧЕШОК	Баковая смесь с соединениями меди каждые 20 дней после начала формирования клубней.	200-300 мл/100 л воды
ЛУК	Баковая смесь с соединениями меди каждые 20 дней после начала формирования клубней.	200-300 мл/100 л воды
СОЯ	Через 25 дней после посева, 3 применения с интервалом 15 дней.	250-300 мл/га
ПЕРСИК	Перед цветением, когда опадают лепестки, в период плодоношения, когда плоды достигают 6-7 см в диаметре.	200-250 мл/100 л воды
САХАРНАЯ СВЕКЛА	Одно применение каждые 20 дней, начиная с 15-20 дней после посева.	250 мл/га
ТАБАК	Одно применение каждые 20 дней, начиная через 20 дней после посева.	200-250 мл/100 л воды
ВИШНЯ	В период плодоношения, когда листья опадают и когда плоды достигают 6-7 см в диаметре.	200-250 мл/100 л воды
АРАХИС	Через 25 дней после посева, 3 применения с интервалом 15 дней.	250-300 мл/га
ОВЕС	С периода 4-5 листьев до конца кущения, 2 применения после кущения.	300-500 мл/га
ОЛИВА	Формирование будущего периода цветения и во время изменения цвета плодов, а также после сбора урожая, если необходимо.	250-300 мл/100 л воды

ОРГАНИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ
ЖИДКОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

BIODEM

ГАРАНТИРОВАННЫЙ СОСТАВ	% М/М
Органическое вещество	45
Органический углерод	20
Общий азот (N)	2
Растворимый в воде оксид калия (K ₂ O)	4
pH	4,7-6,7

ПРОДУКТЫ ОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ЖИДКАЯ ГУМИНОВАЯ КИСЛОТА

FLUX

ГАРАНТИРОВАННЫЙ СОСТАВ	% М/М
Органическое вещество	%45
Органический углерод	%20
Общий азот (N)	%2
Растворимый в воде оксид калия (K ₂ O)	%4
pH	4-6

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

НАЗВАНИЕ РАСТЕНИЙ	ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ	ВНЕКОРНЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ мл/100 л воды/га	ВНЕСЕНИЕ В ПОЧВУ л/га
ТОМАТ, БАКЛАЖАН, ПЕРЕЦ И Т. Д.	- В рассад (2 применения), - В период роста	50-80 80-100	0,8-1 л 0,8-1 л
ДЫНЯ, АРБУЗ, ОГУРЕЦ И Т. Д. (ТЫКВА)	- В период раннего развития - До появления первой воды - В начале развития рукава - В период плодоношения	100-120 100-120 100-120 100-120	0,8-1 л 0,8-1 л 0,8-1 л 0,8-1 л
ВИШНЯ, ПЕРСИК, ЯБЛОНЯ, ГРУША, АБРИКОС, СЛИВА, НЕКТАРИН, ГРАНАТ И Т. Д. на лиственных деревьях	- Сразу после посева - Когда открываются глазки - После цветения или при появлении первых плодов - В период созревания плодов - После сбора фруктов	150-250 150-250 150-250 150-250 150-250	10-15 мл на саженец 3-5 лет 15-25 мл 5-10 лет 25-40 мл на дерево 10 лет и старше 40-50 мл на дерево 40-50 мл на дерево
ВИНОГРАДНИК	- Сразу после посева - Когда открываются глазки - Перед цветением - В период коррозии - После сбора урожая	150-250 150-250 100-200 100-200 100-200	5 кубиков на новый корешок 5-8 кубиков на унцию урожая 0,8-1 л из капельницы 0,8-1 л от капельного полива 0,8-1 л от капельного полива
ОЛИВКИ	- Сразу после посева - Перед цветением - В летний период	200-250 200-250 200-250	В июне 1-3 или 15-20 мл на дерево 3-6 деревьев 15-25 мл 25-40 мл на 6-12 деревьев 40-50 мл на 12 и более деревьев
ХЛОПОК	- Когда появится 8-10 листьев (только на ридях растений) - Период до распускания и цветения - Период первого кокона	150-200 150-200 100-150	
ЦИТРУСОВЫЕ	- До цветения - После цветения - Июнь Перед поливом - Сразу после сбора урожая	150-200 150-200 150-200 200-250	На одно дерево 1-5 лет 10-15 мл 4-8 лет 15-25 мл 8-15 лет 25-40 мл 40-50 мл старше 15 лет
КАРТОФЕЛЬ при первом внесении воды в почву ее дают из расчета 1 литр на 5 декалитров	- Период первого выпуска - До первой воды - В начале цветения - После цветения	150-200 150-200 150-200 150-200	Доза для семян 100 литров воды на 2 тонны семян помещается 100-150 кубиков и вносится. Опрыскиванием вносит 100-200 мл на декал.
КАПУСТА, ЦВЕТНАЯ КАПУСТА, БРОККОЛИ, БРЮССЕЛЬСКАЯ КАПУСТА, КАПУСТА И САЛАТ-ЛАТУК	- После 15-20 дней в период раннего развития (делается 2-3 завязки)	150-200 150-200	При посадке саженцев их окунают в 100 л воды с объемом 100-150 мл и высаживают. На один декалитр приходится 0,8-1 л почвы.
КЛУБНИКА	- В конце зимнего периода - До и после цветения - С интервалом в 15 дней во время сбора урожая	100-150 100-150 100-150	0,8-1 л/га 2 применения
СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ	- Роза, в начале периода бодрствования - Прорастание почек - С интервалом в 20 дней в течение периода развития	150-200 100-150 100-150	0,8-1 л/га 3-4 применения
ТЕПЛИЦЫ	- 2 приложения в периоды разработки	150-200	Вносить 0,8-1 л 2-3 раза на 1000 м² в теплице методом дождевания. Поливать чистой водой сверху.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Может применяться капельно или по листу в течение вегетационного периода в соответствии с потребностями растений
- Может смешиваться с другими препаратами для подкормки растений и пестицидами, за исключением бордосской суспензии и щелочных пестицидов



ВНИМАНИЕ

- Хранить вдали от детей и продуктов питания. При внесении удобрений надевайте маску, перчатки и защитные очки.
- Никогда не превышайте соответствующую дозировку и используйте только в случае необходимости.
- Избегайте попадания в глаза, на лицо и кожу, в случае попадания промойте большим количеством воды.
- Не используйте использованные пустые упаковки для других целей и утилизируйте их.
- Рекомендуется использовать удобрение после анализа почвы и/или листьев.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

НАЗВАНИЕ РАСТЕНИЙ	ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗЫ		ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ
ОВОЩИ (ТОМАТ, ПЕРЕЦ, ОГУРЕЦ, БАКЛАЖАН)	Почвенный полив	3-4 л/га	После образования 3-4 листьев до сбора урожая.
	Лиственный полив	200-300 мл/100 л воды	
ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ (ОЛИВА, ФИСТАШКА, МИНДАЛЬ, ВИНОГРАД, ГРАНАТ, ЯБЛОНЯ, ГРУША, ВИШНЯ, ЧЕРЕШНЯ, ПЕРСИК И Т. Д.)	Почвенный полив	3000-4000 мл/га	Начинается до цветения и через 10 дней до сбора урожая.
	Лиственный полив	200-300 мл/100 л воды	
ПОЛЕВЫЕ КУЛЬТУРЫ (ХЛОПОК, КУКУРУЗА, СОЯ, АРАХИС, ПАДДИ, ПОДСОЛНЕЧНИК, ТАБАК, ПШЕНИЦА)	Почвенный полив	2-3 л/га	После образования 3-5 листьев, с интервалом 15 дней до сбора урожая.
	Лиственный полив	200-300 мл/100 л воды	
ЗЕЛЕННЫЕ НАСАЖДЕНИЯ, СРЕЗАННАЯ ЦВЕТОЧНАЯ КУЛЬТУРА	Почвенный полив	1-2 л/га	С интервалом 15 дней в течение вегетационного периода.
	Лиственный полив	200-300 мл/100 л воды	
ЦИТРУСОВЫЕ, БАНАНЫ	Почвенный полив	2-3 л/га	С интервалом 15 дней в течение вегетационного периода.
	Лиственный полив	200-300 мл/100 л воды	
ДЫНЯ, АРБУЗ, КЛУБНИКА	Почвенный полив	3-4 л/га	С первой подкормкой с интервалом в 10 дней.
	Лиственный полив	300-400 мл/100 л воды	



ЕС УДОБРЕНИЯ
БОР(В), МАНГАН (Mn-Сульфат) и ЦИНК (Zn-Сульфат)
ЖИДКАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ МИКРОРАСТЕНИЙ

AXIS-MICRO

ГАРАНТИРОВАННЫЙ СОСТАВ	% М/М
Водорастворимый бор (В)	5
Водорастворимый марганец (Mn)	3
Водорастворимый цинк (Zn)	5

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

НАЗВАНИЕ РАСТЕНИЙ	СПОСОБ И ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	ЛИСТВЕННЫЙ ПОЛИВ	ПОЧВЕННЫЙ ПОЛИВ
ОВОЩИ (открытый грунт) ТОМАТ, ПЕРЕЦ, ОГУРЕЦ, БАКЛАЖАН и т. д.	Его следует использовать во время образования цветковых пигментов в продукте. Он значительно улучшает окраску, привлекательность и качество.	200-300 мл /100 л воды	1-2 л/га. Применять 1-2 раза
ЯБЛОКО, ГРУША, СЛИВА, АБРИКОС, ВИШНЯ, ПЕРСИК и т. д.	Его следует использовать во время образования цветковых пигментов в плодах. Окраска существенно влияет на привлекательность и качество.	200-300 мл /100 л воды	2-3 л/га. Следует использовать 1-2 раза
КЛУБНИКА	На этапе окрашивания	200-300 мл /100 л воды	1-2 л/га
ОЛИВКА	На этапе окрашивания	200-300 мл /100 л воды	2-3 л/га
ВИНОГРАДНИК	После цветения	200-300 мл /100 л воды	2-3 л/га
КУКУРУЗА	При формировании початков	200-300 мл /100 л воды	1-2 л/га
ДЫНЯ, АРБУЗ	Его следует использовать за 15-20 дней до сбора урожая.	200-300 мл /100 л воды	2-3 л/га
САХАРНАЯ СВЕКЛА	Его следует использовать за 15-20 дней до сбора урожая.	200-300 мл /100 л воды	1-2 л/га
КЛЕВЕР	В течение периода роста	200-300 мл /100 л воды	1-2 л/га
СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ	В течение периода роста	200-300 мл /100 л воды	1-2 л/га
ПШЕНИЦА, РИС, ХЛОПОК, ПОДСОЛНЕЧНИК	В случае необходимости в период роста	200-300 мл /100 л воды	1-2 л/га
ТАБАК	В течение периода роста	200-300 мл /100 л воды	1-2 л/га
БАНАН	Применять 1-2 раза за 30 дней до сбора урожая.	200-300 мл /100 л воды	1-2 л/га

РЕКОМЕНДАЦИИ

- При внесении удобрений надевайте маску, перчатки и защитные очки.
- Никогда не превышайте соответствующие дозы.
- Используйте только там, где это необходимо.
- Хранить вдали от детей и продуктов питания.
- Избегайте попадания в глаза, на лицо и кожу. В случае попадания в глаза и на руки, промойте их большим количеством воды.
- После использования вымойте руки большим количеством воды и утилизируйте использованную пустую упаковку для других целей.
- Рекомендуется использовать удобрение после анализа почвы и/или листьев.



ЕС УДОБРЕНИЕ
РАСТВОР УДОБРЕНИЙ NP

PHOSPO-N

ГАРАНТИРОВАННЫЙ СОСТАВ	% М/М
Общий азот (N)	5
Нитратный азот (NO ₃ -N)	2
Аммонийный азот (NH ₄ -N)	3
Водорастворимый оксид фосфора (P ₂ O ₅)	30
Водорастворимый цинк (Zn)	4

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

НАЗВАНИЕ РАСТЕНИЙ	СПОСОБ И ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	ТИП ПРИМЕНЕНИЯ	
		ЛИСТВЕННЫЙ ПОЛИВ	ПОЧВЕННЫЙ ПОЛИВ
ТЕПЛИЧНЫЕ ОВОЩИ	Применять 4-5 раз с момента появления 4-5 листьев на растениях до сбора урожая	200-250 мл/100 л воды	1-2 л/га
ОВОЩИ ОТКРЫТОГО ГРУНТА	Применять 4-5 раз с момента появления 4-5 листьев на растениях до сбора урожая	200-250 мл/100 л воды	1-2 л/га
ДЫНЯ, АРБУЗ, КЛУБНИКА	Применять 4-5 раз с момента появления 4-5 листьев на растениях до сбора урожая	200-250 мл/100 л воды	1-2 л/га
ЯБЛОКО, ГРУША, АЙВА	Применяется 3-4 раза с интервалом 20 дней от начала плодоношения.	200-250 мл/100 л воды	1-2 л/га
ПЕРСИК, ВИШНЯ, ЧЕРЕШНЯ, АБРИКОС, НЕКТАРИН, СЛИВА	Применяется 3-4 раза с интервалом 20 дней от начала плодоношения.	200-250 мл/100 л воды	1-2 л/га
ВИНОГРАД, БАНАН, ГРАНАТ, ИНЖИР	Применять 3-4 раза с интервалом 20 дней после цветения	200-250 мл/100 л воды	1-2 л/га
ЦИТРУСОВЫЕ, ОЛИВКОВЫЕ, ЧАЙ	Применять 3-4 раза с интервалом 20 дней после цветения	200-250 мл/100 л воды	1-2 л/га
ФУНДУК, ГРЕЦКИЙ ОРЕХ, ФИСТАШКА, КАШТАН	Применяется 3-4 раза с интервалом 20 дней от начала плодоношения.	200-250 мл/100 л воды	1-2 л/га
ХЛОПОК, КУКУРУЗА, ПОДСОЛНЕЧНИК, СОЯ, КАНОЛА	Применять 1-2 раза с момента появления 4-5 листьев на растениях до сбора урожая	200-250 мл/100 л воды	1-2 л/га
КАПУСТА, РЕДИС, МОРКОВЬ, СЕЛЬДЕРЕЙ, ЦВЕТНАЯ КАПУСТА	Применять 1-2 раза с момента появления 4-5 листьев на растениях до сбора урожая	200-250 мл/100 л воды	1-2 л/га
ЗЕРНОВЫЕ, БОБОВЫЕ, КОРМОВЫЕ КУЛЬТУРЫ	Применять 1-2 раза с момента появления 4-5 листьев на растениях до сбора урожая	200-250 мл/100 л воды	1-2 л/га
САХАРНАЯ СВЕКЛА, КАРТОФЕЛЬ, ЛУК, ЧЕСНОК	Применять 1-2 раза с момента образования клубней до сбора урожая	200-250 мл/100 л воды	1-2 л/га
СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ, ЗЕЛЕНЬ, ПОЛЯ, ПАДДИ	Применяется 2-3 раза с интервалом в 30 дней в период развития	200-250 мл/100 л воды	1-2 л/га

ВНИМАНИЕ

- Осторожно! Хранить вдали от детей и продуктов питания.
- Прочтите этикетку перед использованием.
- Не используйте использованную пустую упаковку для других целей и утилизируйте ее.
- Надевайте защитные перчатки и маску.
- После использования вымойте руки большим количеством воды.
- Не глотать. В случае проглатывания проконсультируйтесь с врачом.
- Избегайте попадания на кожу и в глаза, в случае попадания промойте большим количеством воды.
- Рекомендуется использовать удобрение после анализа почвы и/или листьев.



ЕС УДОБРЕНИЯ
РАСТВОР УДОБРЕНИЙ NP

NEW FOS

ГАРАНТИРОВАННЫЙ СОСТАВ	% М/М
Общий азот (N)	5
Нитратный азот (NO ₃ -N)	2,5
Аммонийный азот (NH ₄ -N)	2,5
Водорастворимый пентаоксид фосфора (P ₂ O ₅)	20

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

НАЗВАНИЕ РАСТЕНИЙ	СПОСОБ И ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ	
		ЛИСТВЕННЫЙ ПОЛИВ	ПОЧВЕННЫЙ ПОЛИВ
ДЛЯ ТЕПЛИЧНЫХ ОВОЩЕЙ	Применять 4-5 раз с момента появления 4-5 листьев на растениях до сбора урожая	200-250 мл/100 л воды	1-2 л/га
ДЛЯ ОВОЩЕЙ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ	Применять 4-5 раз с момента появления 4-5 листьев на растениях до сбора урожая	200-250 мл/100 л воды	1-2 л/га
ДЫНЯ, АРБУЗ, КЛУБНИКА	Применять 4-5 раз с момента появления 4-5 листьев на растениях до сбора урожая	200-250 мл/100 л воды	1-2 л/га
ЯБЛОКО, ГРУША, АЙВА	Применяется 3-4 раза с интервалом 20 дней от начала плодоношения.	200-250 мл/100 л воды	1-2 л/га
ПЕРСИК, ВИШНЯ, ВИШНЯ, АБРИКОС, НЕКТАРИН, СЛИВА	Применяется 3-4 раза с интервалом 20 дней от начала плодоношения.	200-250 мл/100 л воды	1-2 л/га
ВИНОГРАД, БАНАН, ГРАНАТ, ИНЖИР	Применять 3-4 раза с интервалом 20 дней после цветения	200-250 мл/100 л воды	1-2 л/га
ЦИТРУСОВЫЕ, ОЛИВКИ, ЧАЙ	Применять 3-4 раза с интервалом 20 дней после цветения	200-250 мл/100 л воды	1-2 л/га
ФУНДУК, ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ, ФИСТАШКИ, ФИСТАШКИ, КАШТАНЫ	Применяется 3-4 раза с интервалом 20 дней от начала плодоношения.	200-250 мл/100 л воды	1-2 л/га
ХЛОПОК, КУКУРУЗА, ПОДСОЛНЕЧНИК, СОЯ, КАНОЛА	Применять 1-2 раза с момента появления 4-5 листьев на растениях до сбора урожая	200-250 мл/100 л воды	1-2 л/га
КАПУСТА, РЕДИС, МОРКОВЬ, СЕЛЬДЕРЕЙ, ЦВЕТНАЯ КАПУСТА	Применять 1-2 раза с момента появления 4-5 листьев на растениях до сбора урожая	200-250 мл/100 л воды	1-2 л/га
ЗЕРНОВЫЕ, БОБОВЫЕ, КОРМА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ	Применять 1-2 раза с момента появления 4-5 листьев на растениях до сбора урожая	200-250 мл/100 л воды	1-2 л/га
САХАРНАЯ СВЕКЛА, КАРТОФЕЛЬ, ЛУК, ЧЕСНОК	Применять 1-2 раза с момента образования клубней до сбора урожая	200-250 мл/100 л воды	1-2 л/га
ДЛЯ СРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВ, ЗЕЛЕНИ, ПОЛЕЙ, РИСА	Применяется 2-3 раза с интервалом в 30 дней в период развития	200-250 мл/100 л воды	1-2 л/га

РАСТВОР
ХЛОРИСТОГО КАЛЬЦИЯ ДЛЯ УДОБРЕНИЙ

ONE PLUS

ГАРАНТИРОВАННЫЙ СОСТАВ	% М/М
Растворимый в воде оксид кальция (CaO)	14
Растворимый в воде бор (B)	0,3

ВНИМАНИЕ

- Никогда не превышайте соответствующие дозы. Используйте только в случае необходимости.
- Храните вдали от детей и продуктов питания.
- При попадании в глаза, на лицо и кожу промыть большим количеством воды.
- После использования вымыть руки большим количеством воды и утилизировать использованные пустые упаковки для других целей.
- При внесении удобрений использовать маску, перчатки и очки.
- Рекомендуется использовать удобрение после анализа почвы и/или листьев.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

НАЗВАНИЕ РАСТЕНИЙ	ДОЗЫ И ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	
	ЛИСТВЕННЫЙ ПОЛИВ	ПОЧВЕННЫЙ ПОЛИВ
ОВОЩИ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ	250-300 мл на 100 литров воды	400-500 мл/га
В ТЕПЛИЦАХ В ПРОХЛАДНЫЕ ЧАСЫ ДНЯ	150-250 мл на 100 литров воды	350-400 мл/га
МЯГКИЕ КОСТОЧКОВЫЕ ПЛОДЫ	300-350 мл на 100 литров воды	450-600 мл или 50 мл на дерево
ТВЕРДЫЕ КОСТОЧКОВЫЕ ПЛОДЫ	300-350 мл на 100 литров воды	450-500 мл или 50 мл на дерево
ВИНОГРАДНИКИ	250-300 мл на 100 литров воды	300-400 мл или 50 мл на дерево
ЦИТРУСОВЫЕ, ОЛИВКОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ	250-300 мл на 100 литров воды	400-450 мл или 50 мл на дерево

ВНИМАНИЕ

- Внимание! Беречь от детей и продуктов питания.
- Прочтите этикетку перед использованием.
- Не используйте использованные пустые упаковки для других целей и не уничтожайте их.
- Используйте защитные перчатки и маску.
- После использования вымойте руки большим количеством воды.
- Не глотайте. При проглатывании обратитесь к врачу.
- Избегайте попадания на кожу и в глаза, в случае попадания промойте большим количеством воды.
- Рекомендуется использовать удобрения после анализа почвы и/или листьев.





РАСТВОР ЦИНКОВЫХ УДОБРЕНИЙ
(СОДЕРЖИТ СУЛЬФАТ ЦИНКА)

ZINCOMIN

ГАРАНТИРОВАННЫЙ СОСТАВ	% М/М
Водорастворимый цинк (Zn)	11
НЕ СОДЕРЖИТ ХЛОРА	



МЕДНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ
УДОБРЕНИЙ

REDOX CU

ГАРАНТИРОВАННЫЙ СОСТАВ	% М/М
Водорастворимая медь (Cu)	5

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

НАЗВАНИЕ РАСТЕНИЙ	СПОСОБ И ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ	
		ЛИСТВЕННЫЙ ПОЛИВ	ПОЧВЕННЫЙ ПОЛИВ
ДЛЯ ТЕПЛИЧНЫХ ОВОЩЕЙ	Применять 4-5 раз с момента появления 4-5 листьев на растениях до сбора урожая	200-250 мл/100 л воды	1-2 л/га
ДЛЯ ОВОЩЕЙ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ	Применять 4-5 раз с момента появления 4-5 листьев на растениях до сбора урожая	200-250 мл/100 л воды	1-2 л/га
ДЫНЯ, АРБУЗ, КЛУБНИКА	Применять 4-5 раз с момента появления 4-5 листьев на растениях до сбора урожая	200-250 мл/100 л воды	1-2 л/га
ЯБЛОКО, ГРУША, АЙВА	Применяется 3-4 раза с интервалом 20 дней от начала плодоношения.	200-250 мл/100 л воды	1-2 л/га
ПЕРСИК, ВИШНЯ, ВИШНЯ, АБРИКОС, НЕКТАРИН, СЛИВА	Применяется 3-4 раза с интервалом 20 дней от начала плодоношения.	200-250 мл/100 л воды	1-2 л/га
ВИНОГРАД, БАНАН, ГРАНАТ, ИНЖИР	Применять 3-4 раза с интервалом 20 дней после цветения	200-250 мл/100 л воды	1-2 л/га
ЦИТРУСОВЫЕ, ОЛИВКИ, ЧАЙ	Применять 3-4 раза с интервалом 20 дней после цветения	200-250 мл/100 л воды	1-2 л/га
ФУНДУК, ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ, ФИСТАШКИ, ФИСТАШКИ, КАШТАНЫ	Применяется 3-4 раза с интервалом 20 дней от начала плодоношения.	200-250 мл/100 л воды	1-2 л/га
ХЛОПОК, КУКУРУЗА, ПОДСОЛНЧНИК, СОЯ, КАНОЛА	Применять 1-2 раза с момента появления 4-5 листьев на растениях до сбора урожая	200-250 мл/100 л воды	1-2 л/га
КАПУСТА, РЕДИС, МОРКОВЬ, СЕЛЬДЕРЕЙ, ЦВЕТНАЯ КАПУСТА	Применять 1-2 раза с момента появления 4-5 листьев на растениях до сбора урожая	200-250 мл/100 л воды	1-2 л/га
ЗЕРНОВЫЕ, БОБОВЫЕ, КОРМА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ	Применять 1-2 раза с момента появления 4-5 листьев на растениях до сбора урожая	200-250 мл/100 л воды	1-2 л/га
САХАРНАЯ СВЕКЛА, КАРТОФЕЛЬ, ЛУК, ЧЕСНОК	Применять 1-2 раза с момента образования клубней до сбора урожая	200-250 мл/100 л воды	1-2 л/га
ДЛЯ СРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВ, ЗЕЛЕНИ, ПОЛЕЙ, РИСА	Применяется 2-3 раза с интервалом в 30 дней в период развития	200-250 мл/100 л воды	1-2 л/га

ВНИМАНИЕ

- Хранить вдали от детей и продуктов питания.
- Не превышать дозировку и используйте только в случае необходимости.
- Избегайте попадания в глаза, на лицо и кожу, в случае попадания промойте большим количеством воды.
- Не используйте использованные пустые упаковки для других целей и уничтожьте их.
- Рекомендуется использовать удобрение после анализа почвы и/или листьев.



ВНИМАНИЕ

- Во время внесения удобрений надевайте маску, перчатки и защитные очки.
- Никогда не превышайте соответствующие дозы.
- Используйте только там, где это необходимо.
- Хранить вдали от детей и продуктов питания.
- Избегайте контакта с глазами, лицом и кожей. В случае попадания в глаза и на руки промойте их большим количеством воды.
- После использования вымойте руки большим количеством воды и утилизируйте использованную пустую упаковку для других целей.
- Рекомендуется использовать удобрение после анализа почвы и/или листьев.



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

НАЗВАНИЕ РАСТЕНИЙ	СПОСОБ И ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ	
		ЛИСТВЕННЫЙ ПОЛИВ	ПОЧВЕННЫЙ ПОЛИВ
ТЕПЛИЧНЫЕ ОВОЩИ	Применять 4-5 раз с момента появления 4-5 листьев на растениях до сбора урожая	200-250 мл/100 л воды	1-2 л/га
ОВОЩИ ОТКРЫТОГО ГРУНТА	Применять 4-5 раз с момента появления 4-5 листьев на растениях до сбора урожая	200-250 мл/100 л воды	1-2 л/га
ДЫНЯ, АРБУЗ, КЛУБНИКА	Применять 4-5 раз с момента появления 4-5 листьев на растениях до сбора урожая	200-250 мл/100 л воды	1-2 л/га
ЯБЛОКО, ГРУША, АЙВА	Применяется 3-4 раза с интервалом 20 дней от начала плодоношения.	200-250 мл/100 л воды	1-2 л/га
ПЕРСИК, ВИШНЯ, ЧЕРЕШНЯ, АБРИКОС, НЕКТАРИН, СЛИВА	Применяется 3-4 раза с интервалом 20 дней от начала плодоношения.	200-250 мл/100 л воды	1-2 л/га
ВИНОГРАД, БАНАН, ГРАНАТ, ИНЖИР	Применять 3-4 раза с интервалом 20 дней после цветения	200-250 мл/100 л воды	1-2 л/га
ЦИТРУСОВЫЕ, ОЛИВКОВЫЕ, ЧАЙНЫЕ	Применять 3-4 раза с интервалом 20 дней после цветения	200-250 мл/100 л воды	1-2 л/га
ФУНДУК, ГРЕЦКИЙ ОРЕХ, ФИСТАШКА, КАШТАН	Применяется 3-4 раза с интервалом 20 дней от начала плодоношения.	200-250 мл/100 л воды	1-2 л/га
ХЛОПОК, КУКУРУЗА, ПОДСОЛНЧНИК, СОЯ, КАНОЛА	Применять 1-2 раза с момента появления 4-5 листьев на растениях до сбора урожая	200-250 мл/100 л воды	1-2 л/га
КАПУСТА, РЕДИС, МОРКОВЬ, СЕЛЬДЕРЕЙ, ЦВЕТНАЯ КАПУСТА	Применять 1-2 раза с момента появления 4-5 листьев на растениях до сбора урожая	200-250 мл/100 л воды	1-2 л/га
ЗЕРНОВЫЕ, БОБОВЫЕ, КОРМОВЫЕ КУЛЬТУРЫ	Применять 1-2 раза с момента появления 4-5 листьев на растениях до сбора урожая	200-250 мл/100 л воды	1-2 л/га
САХАРНАЯ СВЕКЛА, КАРТОФЕЛЬ, ЛУК, ЧЕСНОК	Применять 1-2 раза с момента образования клубней до сбора урожая	200-250 мл/100 л воды	1-2 л/га
СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ, ЗЕЛЕННЫЕ НАСАЖДЕНИЯ, ПАДДИ	В период развития применяется 2-3 раза с интервалом в 30 дней	200-250 мл/100 л воды	1-2 л/га

ОРГАНИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ
ЖИДКОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

REDOX B

ГАРАНТИРОВАННЫЙ СОСТАВ	% М/М
Водорастворимый бор (В)	8

ПРОДУКТЫ ОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ЖИДКАЯ ГУМИНОВАЯ КИСЛОТА

NEWAMIN

ГАРАНТИРОВАННЫЙ СОСТАВ	% М/М
Общее количество органического вещества	35
Органический углерод	12
Общий азот (N)	2
Растворимый в воде оксид калия (K ₂ O)	2
Свободные аминокислоты	11
pH	6,7-8,7

ВНИМАНИЕ

- Никогда не превышайте соответствующие дозы.
- Используйте только в случае необходимости.
- Хранить вдали от детей и продуктов питания.
- Избегайте попадания в глаза, на лицо и кожу. В случае попадания в глаза и на руки промыть большим количеством воды.
- После использования вымойте руки большим количеством воды и утилизируйте использованную пустую упаковку для других целей.
- Во время внесения удобрений надевайте маску, перчатки и защитные очки.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

НАЗВАНИЕ РАСТЕНИЙ	ЛИСТВЕННЫЙ ПОЛИВ	ПОЧВЕННЫЙ ПОЛИВ
ОВОЩИ ОТКРЫТОГО ГРУНТА	150-180 мл на 100 л воды	200-300 мл/га
ТЕПЛИЦЫ	100-150 мл на 100 л воды	250-300 мл/га
МЯГКИЕ КОСТОЧКОВЫЕ ПЛОДЫ	100-150 мл на 100 л воды	200-300 мл/га или 50 мл на дерево
КОСТОЧКОВЫЕ ПЛОДЫ	100-150 мл на 100 л воды	250-300 мл/га или 50 мл на дерево
В ВИНОГРАДНИКАХ	150-200 мл на 100 л воды	200-250 мл/га или 50 мл на дерево
ЦИТРУСОВЫЕ, ОЛИВКОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ	100-150 мл на 100 л воды	200-250 мл/га или 50 мл на дерево
АРБУЗ, ЦВЕТНАЯ КАПУСТА, ЛУК, ЧЕСНОК и т. д.	100-150 мл на 100 л воды	250-300 мл/га
ХЛОПОК, ТАБАК, СВЕКЛА, КУКУРУЗА и т. д.	100-150 мл на 100 л воды	250-300 мл/га
ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ, ПАДДИ и т. д.	100-150 мл на 100 л воды	250-300 мл/га



ВНИМАНИЕ

- Осторожно! Хранить вдали от детей и продуктов питания.
- Прочтите этикетку перед использованием.
- Не используйте использованную пустую упаковку для других целей и утилизируйте ее.
- Используйте защитные перчатки и маску.
- После использования вымойте руки большим количеством воды.
- Не глотать. В случае проглатывания проконсультируйтесь с врачом.
- Избегайте попадания на кожу и в глаза, в случае попадания промойте большим количеством воды.
- Рекомендуется использовать удобрение после анализа почвы и/или листьев.



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

НАЗВАНИЕ РАСТЕНИЙ	ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ	ВНЕКОРНЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ мл/100 л воды/га	ВНЕСЕНИЕ В ПОЧВУ л/га
ТОМАТ, БАКЛАЖАН, ПЕРЕЦ и т. д.	- В рассад (2 применения), - В период роста	50-80 80-100	0,8-1 л 0,8-1 л
ДЫНЯ, АРБУЗ, ОГУРЕЦ и т. д. (ТЫКВА)	- В период раннего развития - До появления первой воды - В начале развития рукава - В период плодоношения	100-120 100-120 100-120 100-120	0,8-1 л 0,8-1 л 0,8-1 л 0,8-1 л
ВИШНЯ, ПЕРСИК, ЯБЛОНЯ, ГРУША, АБРИКОС, СЛИВА, НЕКТАРИН, ГРАНАТ и т. д. на лиственных деревьях	- Сразу после посева - Когда открываются глазки - После цветения или при появлении первых плодов - В период созревания плодов - После сбора фруктов	150-250 150-250 150-250 150-250 150-250	10-15 мл на саженец 3-5 лет 15-25 мл 5-10 лет 25-40 мл на дерево 10 лет и старше 40-50 мл на дерево 40-50 мл на дерево
ВИНОГРАДНИК	- Сразу после посева - Когда открываются глазки - Перед цветением - В период коррозии - После сбора урожая	150-250 150-250 100-200 100-200 100-200	5 кубиков на новый корешок 5-8 кубиков на унцию урожая 0,8-1 л из капельницы 0,8-1 л от капельного полива 0,8-1 л от капельного полива
ОЛИВКИ	- Сразу после посева - Перед цветением - В летний период	200-250 200-250 200-250	В июне 1-3 или 15-20 мл на дерево 3-6 деревьев 15-25 мл 25-40 мл на 6-12 деревьев 40-50 мл на 12 и более деревьев
ХЛОПОК	- Когда появляется 8-10 листья (только на рядах растений) - Период до распускания и цветения - Период первого кокона	150-200 150-200 100-150	
ЦИТРУСОВЫЕ	- До цветения - После цветения - Июнь Перед поливом - Сразу после сбора урожая	150-200 150-200 150-200 200-250	На одно дерево 1-5 лет 10-15 мл 4-8 лет 15-25 мл 8-15 лет 25-40 мл 40-50 мл старше 15 лет
КАРТОФЕЛЬ при первом внесении воды в почву ее дают из расчета 1 литр на 5 декалитров	- Период первого выпуска - До первой воды - В начале цветения - После цветения	150-200 150-200 150-200 150-200	Доза для семян 100 литров воды на 2 тонны семян помещается 100-150 кубиков и вносятся. Опрыскиванием вносят 100-200 мл на декар.
КАПУСТА, ЦВЕТНАЯ КАПУСТА, БРОККОЛИ, БРЮССЕЛЬСКАЯ КАПУСТА, КАПУСТА и САЛАТ-ЛАТУК	- После 15-20 дней в период раннего развития (делается 2-3 завязки)	150-200 150-200	При посадке саженцев их окунают в 100 л воды с объемом 100-150 мл и высаживают. На один декалитр приходится 0,8-1 л почвы.
КЛУБНИКА	- В конце зимнего периода - До и после цветения - С интервалом в 15 дней во время сбора урожая	100-150 100-150 100-150	0,8-1 л/га 2 применения
СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ	- Роза, в начале периода бодрствования - Прорастание почек - С интервалом в 20 дней в течение периода развития	150-200 100-150 100-150	0,8-1 л/га 3-4 применения
ТЕПЛИЦЫ	- 2 приложения в периоды разработки	150-200	Вносить 0,8-1 л 2-3 раза на 1000 м ² в теплице методом дождевания. Поливать чистой водой сверху.

ПРОДУКТЫ ИЗ ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ
ЖИДКИЕ МОРСКИЕ ВОДОРОСЛИ

MERMAID

ГАРАНТИРОВАННЫЙ СОСТАВ	% М/М
Органическое вещество % 15Альгиновая кислота	0,3
Водорастворимый оксид калия (K ₂ O)	3
Максимальный ЕС (дС/м)	15
pH	4,7-6,7

ПРОДУКТЫ ОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ЖИДКАЯ ГУМИНОВАЯ КИСЛОТА

K-LITE

ГАРАНТИРОВАННЫЙ СОСТАВ	% М/М
Общий азот (N)	3
Азот мочевины (NH ₂ -N)	3
Растворимый в воде оксид калия (K ₂ O)	25

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

НАЗВАНИЕ РАСТЕНИЙ	ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ	ЛИСТВЕННЫЙ ПОЛИВ	КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ
ОВОЩИ: ПОМИДОРЫ, ПЕРЕЦ, БАКЛАЖАНЫ, ФАСОЛЬ, ГОРОХ, КАРТОФЕЛЬ, ЛУК, ЧЕСНОК, ОГУРЕЦ, ДЫНЯ, АРБУЗ, ТЫКВА и т. д. (Все виды открытого и закрытого грунта)	- На ранних стадиях развития растения (завязывание цветов) - От цветения до сбора урожая (2-3 применения)	100-150 мл 100-150 мл	400-500 мл
ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ: МЯГКИЕ И КОСТОЧКОВЫЕ ФРУКТЫ, ВИШНЯ, ЧЕРЕШНЯ, ПЕРСИКИ, АБРИКОСЫ, СЛИВА, ВИШНЯ, ЯБЛОКО, ГРУША, МИНДАЛЬ, ФУНДУК, ГРАНАТ и т. д.	- Начало цветения, плодоношения 1 применение в период завязывания, развития плодов и окраски	100-150 мл	400-500 мл
ВИНОГРАДНИК: СТОЛОВЫЙ ВИНОГРАД И ИЗЮМ РАССАДА ДЛЯ ВСЕХ СОРТОВ.	- При росте побегов 3-5 см, в период выхода грозди, перед цветением, на тонких и крупных кустах, в период пресноводного хождения.	100-150 мл	400-500 мл
КЛУБНИКА	В течение сезона	100-150 мл	400-500 мл
ХЛОПОК	- от периода с 6-8 листьями до сбора урожая	100-150 мл	400-500 мл
ТЕПЛИЧНЫЕ И СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ	- На протяжении всего периода развития	100-150 мл	400-500 мл
САЛАТ-ЛАТУК, ПЕТРУШКА, КРЕСС- САЛАТ, РУКОЛА и т. д. (Зеленые растения)	- На протяжении всего периода развития	100-150 мл	400-500 мл
ПОЛЕВЫЕ КУЛЬТУРЫ: ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС, РИС и т. д.	2 применения с интервалом 10 дней в период кушения.	100-150 мл	400-500 мл
ОЛИВКИ	- Начало цветения, плодоношения Вплоть до периода завязывания и окрашивания, в течение всего летнего периода.	100-150 мл	400-500 мл
ЦИТРУСОВЫЕ	- Период цветения, период завязывания плодов и до сбора урожая.	100-150 мл	400-500 мл
ТАБАК	- 3 применения в период рассады, от посадки до периода прореживания.	100-150 мл	400-500 мл
ПРОМЫШЛЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ: САХАРНАЯ СВЕКЛА, АНИС, КУКУРУЗА, ПОДСОЛНЕЧНИК и т. д.	- Минимум 2 применения в период раннего развития	100-150 мл	400-500 мл
НУТ	- Минимум 2 применения в начале цветения	100-150 мл	400-500 мл

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Может применяться капельно или на лист в течение вегетационного периода в зависимости от потребностей растений.
- Может смешиваться с другими продуктами для подкормки растений и пестицидами, за исключением бордосской суспензии и щелочных пестицидов.

ВНИМАНИЕ

- Никогда не превышайте соответствующие дозы.
- Использовать только в случае необходимости.
- Держите подальше от детей и продуктов питания.
- ВЫЗЫВАЕТ РАЗДРАЖЕНИЕ. Избегайте попадания в глаза, на лицо и кожу. В случае попадания в глаза и на руки промойте их большим количеством воды.
- После использования вымойте руки большим количеством воды и утилизируйте использованную пустую упаковку для других целей.
- Во время внесения удобрений надевайте маску, перчатки и защитные очки.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

НАЗВАНИЕ РАСТЕНИЙ	ЛИСТВЕННЫЙ ПОЛИВ	КАПЕЛЬНОЕ ОРОШЕНИЕ
ОВОЩИ ОТКРЫТОГО ГРУНТА	200-300 мл на 100 л воды	1-2 л/га
ТЕПЛИЦЫ	150-250 мл на 100 л воды	1,5-2 л/га
МЯГКИЕ КОСТОЧКОВЫЕ ПЛОДЫ	300-350 мл на 100 л воды	2-3 л/га или 100 г на дерево
КОСТОЧКОВЫЕ ПЛОДЫ	300-350 мл на 100 л воды	1-2 л/га или 70 г на дерево
В ВИНОГРАДНИКАХ	250-300 мл на 100 л воды	1,5-2 л/га или 60 г на дерево
ЦИТРУСОВЫЕ, ОЛИВКОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ	250-300 мл на 100 л воды	1-2 л/га или 70 г на дерево
АРБУЗ, ЦВЕТНАЯ КАПУСТА, ЛУК, ЧЕСНОК и т. д.	150-200 мл на 100 л воды	1,5-2 л/га
ХЛОПОК, ТАБАК, СВЕКЛА, КУКУРУЗА и т. д.	250-300 мл на 100 л воды	1,5-2 л/га
ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ, ПАДДИ и т. д.	150-250 мл на 100 л воды	1-2 л/га



ЕС УДОБРЕНИЕ
РАСТВОР УДОБРЕНИЙ NPK

TETRA

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Беречь от детей и продуктов питания. Во время внесения удобрений используйте маску, перчатки и очки.
- Избегать попадания в глаза, на лицо и на кожу. В случае попадания промыть большим количеством воды.
- Использованную пустую упаковку утилизируйте и не используйте ее для других целей.
- Рекомендуется использовать удобрения после анализа почвы и/или листьев.

TETRA 7-7-7

ГАРАНТИРОВАННЫЙ СОСТАВ	% М/М
Общий азот (N)	7
Азот мочевины (N)	7
Водорастворимый пентаоксид фосфора (P ₂ O ₅)	7
Водорастворимый оксид калия (K ₂ O)	7

TETRA 4-6-10

ГАРАНТИРОВАННЫЙ СОСТАВ	% М/М
Общий азот (N)	4
Азот мочевины (N)	4
Водорастворимый пентаоксид фосфора (P ₂ O ₅)	6
Водорастворимый оксид калия (K ₂ O)	10

TETRA 7-21-3

ГАРАНТИРОВАННЫЙ СОСТАВ	% М/М
Общий азот (N)	7
Аммонийный азот (N)	4
Нитратный азот (N)	3
Водорастворимый пентаоксид фосфора (P ₂ O ₅)	21
Водорастворимый оксид калия (K ₂ O)	3

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

НАЗВАНИЕ РАСТЕНИЙ	ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ	ЛИСТВЕННЫЙ ПОЛИВ	КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ
ОВОЩИ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ	После пересадки рассады обработку производят каждые 20 дней в течение всего сезона.	200-250 мл	450-500 мл/день
В ТЕПЛИЦАХ	В виде еженедельных обработок, начиная с рассадного периода.	150-250 мл	350-400 мл/день
В ПЛОДАХ С МЯГКИМИ КОСТОЧКАМИ	Внесение производится каждые 20 дней в течение сезона, начиная с стадии рассады.	200-250 мл	450-600 мл/день или 50 мл на дерево
В КОСТОЧКОВЫХ ФРУКТАХ	После глоточного периода каждые 25 дней.	250-300 мл	450-600 мл/день или 50 мл на дерево
В ВИНОГРАДНИКАХ	Обработку производят каждые 25 дней после цветения в течение всего сезона.	250-300 мл	300-400 мл/день или 50 мл на дерево
ЦИТРУСОВЫЕ НА ОЛИВКОВЫХ ДЕРЕВЬЯХ	Внесение производится каждые 20 дней в течение сезона, начиная с стадии рассады.	250-300 мл	400-450 мл/день или 50 мл на дерево
АРБУЗ, ЦВЕТНАЯ КАПУСТА, ЛУК, ЧЕСНОК	Вносится в течение всего сезона с интервалом в 15 дней после второй прополки.	150-250 мл	350-400 мл/день
ХЛОПОК, ТАБАК, Ш.СВЕКЛА, КУКУРУЗА и т. д.	Вносится в течение всего сезона с интервалом в 15 дней после второй прополки.	150-250 мл	350-400 мл/день
ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ, РИС и т. д.	Вносится в течение всего сезона с интервалом в 15 дней после второй прополки.	150-250 мл	350-400 мл/день



ЕС УДОБРЕНИЯ
СМЕСЬ МИКРОПИТАТЕЛЬНЫХ РАСТЕНИЙ МАРГАНЦА (MN-СУЛЬФАТ) И ЦИНКА (ZN-СУЛЬФАТ)

EXE MNZN

ГАРАНТИРОВАННЫЙ СОСТАВ	% М/М
Водорастворимый марганец (Mn)	14
Водорастворимый цинк (Zn)	12

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Во время внесения удобрений используйте маску, перчатки и очки.
- Никогда не превышайте соответствующие дозы.
- Используйте только при необходимости.
- Держите подальше от детей и продуктов питания.
- Избегайте попадания в глаза, на лицо и на кожу. При попадании в глаза и руки промойте большим количеством воды.
- После использования вымойте руки большим количеством воды и выбросьте использованную пустую упаковку, прежде чем использовать ее для других целей.
- Рекомендуется использовать удобрения после анализа почвы и/или листьев.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

НАЗВАНИЕ РАСТЕНИЙ	ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ	ЛИСТВЕННЫЙ ПОЛИВ	КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ
ОВОЩИ (ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ), ПОМИДОРЫ, ПЕРЕЦ, ОГУРЦЫ, БАКЛАЖАНЫ и т. д.	Его следует использовать при формировании цветковых пигментов в продукте. Окраска существенно влияет на внешний вид и качество.	200-300 г/100 л воды	1-2 кг/га. Его следует применять 1-2 раза.
ЯБЛОКО, ГРУША, СЛИВА, АБРИКОС, ВИШНЯ, ПЕРСИК и т. д.	Его следует использовать при образовании цветковых пигментов в плодах. Окраска существенно влияет на привлекательность и качество.	200-300 г/100 л воды	2-3 кг/га. Его следует использовать 1-2 раза.
КЛУБНИКА	На стадии окрашивания.	200-300 г/100 л воды	1-2 кг/га
ОЛИВКОВОЕ ДЕРЕВО	На стадии окрашивания.	200-300 г/100 л воды	2-3 кг/га
ВИНОГРАДНИК	На стадии зеленого винограда.	200-300 г/100 л воды	2-3 кг/га
КУКУРУЗА	В початковом формировании.	200-300 г/100 л воды	1-2 кг/га
ДЫНЯ, АРБУЗ	Его следует использовать за 15-20 дней до сбора урожая.	200-300 г/100 л воды	2-3 кг/га
САХАРНАЯ СВЕКЛА	Его следует использовать за 15-20 дней до сбора урожая.	200-300 г/100 л воды	1-2 кг/га
КЛЕВЕР	В период роста	200-300 г/100 л воды	1-2 кг/га
СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ	В период роста	200-300 г/100 л воды	1-2 кг/га
ПШЕНИЦА, РИС, ХЛОПОК, ПОДСОЛНЕЧНИК	При необходимости В период роста	200-300 г/100 л воды	1-2 кг/га
ТАБАК	В период роста	200-300 г/100 л воды	1-2 кг/га
БАНАН	Применять 1-2 раза за 30 дней до сбора урожая.	200-300 г/100 л воды	1-2 кг/га





ЕС УДОБРЕНИЯ
РАСТВОР УДОБРЕНИЙ NP

SET-UP



ЕС УДОБРЕНИЯ
СМЕСЬ ТВЕРДЫХ МИКРОРАСТИТЕЛЬНЫХ ПИТАТЕЛЬНЫХ
ВЕЩЕСТВ БОР (В), МЕДЬ (CU-СУЛЬФАТ), ЖЕЛЕЗО (FE-СУЛЬФАТ),
МАРГАНЕЦ (MN-СУЛЬФАТ) И ЦИНК (ZN-СУЛЬФАТ)

MIKROFIX COMBI

ГАРАНТИРОВАННЫЙ СОСТАВ	% М/М
Водорастворимый бор (В)	1
Водорастворимая медь (Cu)	0,5
Водорастворимое железо (Fe)	4
Водорастворимый марганец (Mn)	4
Водорастворимый цинк (Zn)	4

РЕКОМЕНДАЦИИ

Водорастворимые соли металлов превращаются в соли металлов, такие как оксиды металлов-карбонаты металлов, которые нерастворимы в воде и поэтому не могут быть использованы растениями, если pH почвы и воды высоки.

SET UP обладает хорошей способностью удерживать катионы благодаря своей комплексообразующей способности. Он при всех условиях образует сложную структуру с соединениями металлов и щелочноземельных металлов, такими как оксиды, гидроксиды и карбонаты, и связывается сам с собой, образуя комплекс водорастворимых солей металлов.

создает.

Эта сложная структура, которую растение легко усваивает, стабильна. Карбонатные и бикарбонатные соли кальция и магния, которые присутствуют в структуре поливной воды и вызывают временную и постоянную жесткость, образуют в трубах структуру, которую мы называем кальцификацией. По этой причине в оросительных трубах время от времени возникают засоры.

SET UP используется для предотвращения этих блокировок. **SET UP** не является полностью кислым и имеет подходящий уровень pH. Благодаря этой функции он является идеальным регулятором pH для поливной воды.

Он не содержит минеральных кислот, таких как азотная и фосфорная кислоты, которые могут вызвать засоление почвы.



РЕКОМЕНДАЦИИ

- Во время внесения удобрений используйте маску, перчатки и очки.
- Никогда не превышайте соответствующие дозы.
- Используйте только при необходимости.
- Держите вдали от детей и продуктов питания.
- Избегайте попадания в глаза, на лицо и на кожу. При попадании в глаза и руки промойте большим количеством воды.
- После использования вымойте руки большим количеством воды и выбросьте использованную пустую упаковку, прежде чем использовать ее для других целей.
- Рекомендуется использовать удобрения после анализа почвы и/или листьев.



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

НАЗВАНИЕ РАСТЕНИЙ	ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО
ОВОЩИ, ПОМИДОРЫ, ПЕРЕЦ, БАКЛАЖАНЫ и т. д.	Применяется с интервалом 2-3 недели в начале цветения.	100-150 г на 100 л воды
ФРУКТЫ, ЦИТРУСОВЫЕ, ЯБЛОКИ, ГРУШИ и т. д.	Применяется при достижении плодами размеров грецкого ореха и на нижних побегах.	100-150 г на 100 л воды
ВИНОГРАДНИК	2-3 применения, начиная с созревания грозди	10-20 г / виноградная лоза
КУКУРУЗА	Его применяют, когда растение достигнет 40-50 см в высоту.	150 г/га
ХЛОПОК	Используется непосредственно перед и сразу после цветения.	100-200 г/га
САХАРНАЯ СВЕКЛА	Применяется в 6-8-лиственной период.	100 г/га
КАРТОФЕЛЬ	В период формирования клубней делают 2-3 обработки.	150 г/га
ЛУК	Его вносят дважды через 30 дней после посадки.	100 г/га
ПШЕНИЦА	Применение производится в период кущения.	100 г/га
СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ	С самого начала делается 2-3 аппликации.	100 г на 100 л воды
ДЫНЯ, АРБУЗ	Применяется 2-3 раза с момента образования плодов.	100 г/га

ПРОДУКТЫ ОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ЖИДКАЯ ГУМИНОВАЯ КИСЛОТА

HUMATİN

ГАРАНТИРОВАННЫЙ СОСТАВ	% М/М
Органическое вещество	12
Всего (гуминовая + фульвокислота)	15
pH	9,3-11,3

ЕС УДОБРЕНИЯ
МЕДНАЯ СУСПЕНЗИЯ (СОДЕРЖИТ ОКСИХЛОРИД МЕДИ)

HEADLAND COOPER

ГАРАНТИРОВАННЫЙ СОСТАВ	% М/М
Всего меди (Cu)	19

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

НАЗВАНИЕ РАСТЕНИЙ	СПОСОБ И ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ	
		ЛИСТВЕННЫЙ ПОЛИВ	ПОЧВЕННЫЙ ПОЛИВ
ЦИТРУСОВЫЕ	* Перед цветением * Когда плоды достигают крупных размеров	200-250 мл/100 л воды	1-3 л/га
ЯБЛОКО, ГРУША и т.д..	* До цветения и после цветения.	200-250 мл/100 л воды	1-3 л/га
ПЕРСИК, АБРИКОС, ВИШНЯ, ВИШНЯ, СЛИВА И ГРАНАТ	* До цветения и после цветения.	200-250 мл/100 л воды	1-3 л/га
ВИНОГРАДНИК	* Перед цветением * Когда плоды достигают крупных размеров	200-250 мл/100 л воды	1-3 л/га
ФИСТАШКА, ФУНДУК	* До цветения * После завязывания плодов	200-250 мл/100 л воды	1-3 л/га
ОЛИВКОВОЕ ДЕРЕВО	* Перед цветением * Когда плоды достигают крупных размеров	200-250 мл/100 л воды	1-3 л/га
БАНАН	* Перед цветением * В период роста плодов	200-250 мл/100 л воды	1-3 л/га
КИВИ, ИНЖИР	* Перед цветением * В период роста плодов	200-250 мл/100 л воды	1-3 л/га
ПОМИДОРЫ, ПЕРЕЦ	* Перед цветением * В период роста плодов	200-250 мл/100 л воды	1-3 л/га
ОГУРЕЦ, БАКЛАЖАН	* Перед цветением * В период роста плодов	200-250 мл/100 л воды	1-3 л/га
ДЫНЯ, АРБУЗ	* 10 дней после посадки * До цветения	200-250 мл/100 л воды	1-3 л/га
Срезанные цветы	* Перед цветением * В период роста плодов	200-250 мл/100 л воды	1-3 л/га
ЧЕЧЕВИЦА, НУТ	* Перед цветением * В период роста плодов	50 мл – 1 л/день	1-3 л/га
АРАХИС	* Перед цветением * В период роста плодов	500 мл – 1 л/день	1-3 л/га
ХЛОПОК, ПОДСОЛНЕЧНИК, КУКУРУЗА, КАНОЛА и т.д.	* Когда он достигнет высоты 20-40 см. * Когда он достигнет высоты 50-70 см.	200-250 мл/день	1-3 л/га

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Его можно наносить без капель или по листьям в течение вегетационного периода в зависимости от потребностей растений
- Может смешиваться с другими продуктами питания растений и пестицидами, за исключением бордосской суспензии и щелочных препаратов



РЕКОМЕНДАЦИИ

- Во время внесения удобрений используйте маску, перчатки и очки.
- Никогда не превышайте соответствующие дозы.
- Используйте только при необходимости.
- Держите вдали от детей и продуктов питания.
- Избегайте попадания в глаза, на лицо и на кожу. При попадании в глаза и руки промойте большим количеством воды.
- После использования вымойте руки большим количеством воды и выбросьте использованную пустую упаковку, прежде чем использовать ее для других целей.
- Рекомендуется использовать удобрения после анализа почвы и/или листьев.



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

НАЗВАНИЕ РАСТЕНИЙ	СПОСОБ И ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	ПОЧВЕННЫЙ ПОЛИВ
ДЛЯ ТЕПЛИЧНЫХ ОВОЩЕЙ	Его применяют 4-9 раз от стадии 4-5 листьев растений до сбора урожая.	1-2 л/га
ДЛЯ ОВОЩЕЙ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ	Применяют 4-5 раз от стадии 4-5 листьев растений до сбора урожая.	1-2 л/га
ДЫНЯ, АРБУЗ, КЛУБНИКА	Применяют 4-5 раз от стадии 4-5 листьев растений до сбора урожая.	1-2 л/га
ЯБЛОКО, ГРУША, АЙВА	Применяют 3-4 раза с интервалом 20 дней, начиная с завязывания плодов.	1-2 л/га
ПЕРСИК, ВИШНЯ, АБРИКОС, НЕКТАРИН, СЛИВА	Применяют 3-4 раза с интервалом 20 дней, начиная с завязывания плодов.	1-2 л/га
ВИНОГРАД, БАНАН, ГРАНАТ, ИНЖИР	Применяют 3-4 раза с интервалом 20 дней после цветения.	1-2 л/га
ЦИТРУСОВЫЕ, ОЛИВКИ, ЧАЙ	Применяют 3-4 раза с интервалом 20 дней после цветения.	1-2 л/га
ФУНДУК, ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ, ФИСТАШКИ, КАШТАНЫ	Применяют 3-4 раза с интервалом 20 дней, начиная с завязывания плодов.	1-2 л/га
ХЛОПОК, КУКУРУЗА, ПОДСОЛНЕЧНИК, СОЯ, КАНОЛА	Применяют 1-2 раза от стадии 4-5 листьев растений до сбора урожая.	1-2 л/га
КАПУСТА, РЕДИС, МОРКОВЬ, СЕЛЬДЕРЕИ, КАБАБАХАР	Применяют 1-2 раза от стадии 4-5 листьев растений до сбора урожая.	1-2 л/га
ЗЕРНОВЫЕ, БОБОВЫЕ, КОРМОВЫЕ КУЛЬТУРЫ	Применяют 1-2 раза от стадии 4-5 листьев растений до сбора урожая.	1-2 л/га
САХАРНАЯ СВЕКЛА, КАРТОФЕЛЬ, ЛУК, ЧЕСНОК	Применяют 1-2 раза от формирования клубней до сбора урожая.	1-2 л/га
СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ, ЗЕЛЕННЫЕ НАСАЖДЕНИЯ, РИС	Применяется 2-3 раза с интервалом 30 дней в период развития.	1-2 л/га

ЕС УДОБРЕНИЯ
РАСТВОР УДОБРЕНИЙ NK

HEADLAND HI-K

ГАРАНТИРОВАННЫЙ СОСТАВ	% М/М
Общий азот (N)	3
Мочевина Азот (N)	3
Водорастворимый оксид калия (K ₂ O)	28

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

НАЗВАНИЕ РАСТЕНИЙ	СПОСОБ И ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ	
		ЛИСТВЕННЫЙ ПОЛИВ	ПОЧВЕННЫЙ ПОЛИВ
ДЛЯ ТЕПЛИЧНЫХ ОВОЩЕЙ	Применяют 4-5 раз от стадии 4-5 листьев растений до сбора урожая.	200-250 мл / 100 л воды	1-2 л/га
ДЛЯ ОВОЩЕЙ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ	Применяют 4-5 раз от стадии 4-5 листьев растений до сбора урожая.	200-250 мл / 100 л воды	1-2 л/га
ДЫНЯ, АРБУЗ, КЛУБНИКА	Применяют 4-5 раз от стадии 4-5 листьев растений до сбора урожая.	200-250 мл / 100 л воды	1-2 л/га
ЯБЛОКО, ГРУША, АЙВА	Применяют 3-4 раза с интервалом 20 дней, начиная с завязывания плодов.	200-250 мл / 100 л воды	1-2 л/га
ПЕРСИК, ВИШНЯ, ЧЕРЕШНЯ, АБРИКОС, НЕКТАРИН, СЛИВА	Применяют 3-4 раза с интервалом 20 дней, начиная с завязывания плодов.	200-250 мл / 100 л воды	1-2 л/га
ВИНОГРАД, БАНАНЫ, ГРАНАТЫ, ИНЖИР	Применяют 3-4 раза с интервалом 20 дней после цветения.	200-250 мл / 100 л воды	1-2 л/га
ЦИТРУСОВЫЕ, ОЛИВКИ, ЧАЙ	Применяют 3-4 раза с интервалом 20 дней после цветения.	200-250 мл / 100 л воды	1-2 л/га
ФУНДУК, ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ, ФИСТАШКИ, КАШТАНЫ	Применяют 3-4 раза с интервалом 20 дней, начиная с завязывания плодов.	200-250 мл / 100 л воды	1-2 л/га
ХЛОПОК, КУКУРУЗА, ПОДСОЛНЕЧНИК, СОЯ, КАНОЛА	Применяют 1-2 раза от стадии 4-5 листьев растений до сбора урожая.	200-250 мл / 100 л воды	1-2 л/га
КАПУСТА, РЕДИС, МОРКОВЬ, СЕЛЬДЕРЕИ, ЦВЕТНАЯ КАПУСТА	Применяют 1-2 раза от стадии 4-5 листьев растений до сбора урожая.	200-250 мл / 100 л воды	1-2 л/га
ЗЕРНОВЫЕ, БОБОВЫЕ, КОРМОВЫЕ КУЛЬТУРЫ	Применяют 1-2 раза от стадии 4-5 листьев растений до сбора урожая.	200-250 мл / 100 л воды	1-2 л/га
САХАРНАЯ СВЕКЛА, КАРТОФЕЛЬ, ЛУК, ЧЕСНОК	Применяют 1-2 раза от формирования клубней до сбора урожая.	200-250 мл / 100 л воды	1-2 л/га
СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ, ЗЕЛЕННЫЕ НАСАЖДЕНИЯ, РИСОВЫЕ ПОЛЯ	Применяется 2-3 раза с интервалом 30 дней в период развития.	200-250 мл / 100 л воды	1-2 л/га

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Во время внесения удобрений используйте маску, перчатки и очки.
- Никогда не превышайте соответствующие дозы.
- Используйте только при необходимости.
- Держите подальше от детей и продуктов питания.
- Избегайте попадания в глаза, на лицо и на кожу. При попадании в глаза и руки промойте большим количеством воды.
- После использования вымойте руки большим количеством воды и выбросьте использованную пустую упаковку, прежде чем использовать ее для других целей.
- Рекомендуется использовать удобрения после анализа почвы и/или листьев.



ЕС УДОБРЕНИЯ
РАСТВОР АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ

HEADLAND HI-N

ГАРАНТИРОВАННЫЙ СОСТАВ	% М/М
Общий азот (N)	24
Аммонийный азот (NH ₄ -N)	6
Нитратный азот (N)	6
Азот мочевины (NH ₂ -N)	12
Водорастворимая медь (Cu)	0,6
Водорастворимый марганец (Mn)	0,6

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

НАЗВАНИЕ РАСТЕНИЙ	СПОСОБ И ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ	
		ЛИСТВЕННЫЙ ПОЛИВ	ПОЧВЕННЫЙ ПОЛИВ
ДЛЯ ТЕПЛИЧНЫХ ОВОЩЕЙ	Применяют 4-5 раз от стадии 4-5 листьев растений до сбора урожая.	200-250 мл / 100 л воды	1-2 л/га
ДЛЯ ОВОЩЕЙ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ	Применяют 4-5 раз от стадии 4-5 листьев растений до сбора урожая.	200-250 мл / 100 л воды	1-2 л/га
ДЫНЯ, АРБУЗ, КЛУБНИКА	Применяют 4-5 раз от стадии 4-5 листьев растений до сбора урожая.	200-250 мл / 100 л воды	1-2 л/га
ЯБЛОКО, ГРУША, АЙВА	Применяют 3-4 раза с интервалом 20 дней, начиная с завязывания плодов.	200-250 мл / 100 л воды	1-2 л/га
ПЕРСИК, ВИШНЯ, ЧЕРЕШНЯ, АБРИКОС, НЕКТАРИН, СЛИВА	Применяют 3-4 раза с интервалом 20 дней, начиная с завязывания плодов.	200-250 мл / 100 л воды	1-2 л/га
ВИНОГРАД, БАНАНЫ, ГРАНАТЫ, ИНЖИР	Применяют 3-4 раза с интервалом 20 дней после цветения.	200-250 мл / 100 л воды	1-2 л/га
ЦИТРУСОВЫЕ, ОЛИВКИ, ЧАЙ	Применяют 3-4 раза с интервалом 20 дней после цветения.	200-250 мл / 100 л воды	1-2 л/га
ФУНДУК, ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ, ФИСТАШКИ, КАШТАНЫ	Применяют 3-4 раза с интервалом 20 дней, начиная с завязывания плодов.	200-250 мл / 100 л воды	1-2 л/га
ХЛОПОК, КУКУРУЗА, ПОДСОЛНЕЧНИК, СОЯ, КАНОЛА	Применяют 1-2 раза от стадии 4-5 листьев растений до сбора урожая.	200-250 мл / 100 л воды	1-2 л/га
КАПУСТА, РЕДИС, МОРКОВЬ, СЕЛЬДЕРЕИ, ЦВЕТНАЯ КАПУСТА	Применяют 1-2 раза от стадии 4-5 листьев растений до сбора урожая.	200-250 мл / 100 л воды	1-2 л/га
ЗЕРНОВЫЕ, БОБОВЫЕ, КОРМОВЫЕ КУЛЬТУРЫ	Применяют 1-2 раза от стадии 4-5 листьев растений до сбора урожая.	200-250 мл / 100 л воды	1-2 л/га
САХАРНАЯ СВЕКЛА, КАРТОФЕЛЬ, ЛУК, ЧЕСНОК	Применяют 1-2 раза от формирования клубней до сбора урожая.	200-250 мл / 100 л воды	1-2 л/га
СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ, ЗЕЛЕННЫЕ НАСАЖДЕНИЯ, РИСОВЫЕ ПОЛЯ	Применяется 2-3 раза с интервалом 30 дней в период развития.	200-250 мл / 100 л воды	1-2 л/га



РЕКОМЕНДАЦИИ

- Во время внесения удобрений используйте маску, перчатки и очки.
- Никогда не превышайте соответствующие дозы.
- Используйте только при необходимости.
- Держите подальше от детей и продуктов питания.
- Избегайте попадания в глаза, на лицо и на кожу. При попадании в глаза и руки промойте большим количеством воды.
- После использования вымойте руки большим количеством воды и выбросьте использованную пустую упаковку, прежде чем использовать ее для других целей.
- Рекомендуется использовать удобрения после анализа почвы и/или листьев.

ЕС УДОБРЕНИЯ
РАСТВОР УДОБРЕНИЙ NK

HEADLAND HI-PHOS

ГАРАНТИРОВАННЫЙ СОСТАВ	% М/М
Водорастворимый пентаоксид фосфора (P ₂ O ₅)	10
Водорастворимый оксид калия (K ₂ O)	5,1
Водорастворимый оксид магния (MgO)	5,5

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

НАЗВАНИЕ РАСТЕНИЙ	СПОСОБ И ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ	
		ЛИСТВЕННЫЙ ПОЛИВ	ПОЧВЕННЫЙ ПОЛИВ
ДЛЯ ТЕПЛИЧНЫХ ОВОЩЕЙ	Применяют 4-5 раз от стадии 4-5 листьев растений до сбора урожая.	200-250 мл / 100 л воды	1-2 л/га
ДЛЯ ОВОЩЕЙ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ	Применяют 4-5 раз от стадии 4-5 листьев растений до сбора урожая.	200-250 мл / 100 л воды	1-2 л/га
ДЫНЯ, АРБУЗ, КЛУБНИКА	Применяют 4-5 раз от стадии 4-5 листьев растений до сбора урожая.	200-250 мл / 100 л воды	1-2 л/га
ЯБЛОКО, ГРУША, АЙВА	Применяют 3-4 раза с интервалом 20 дней, начиная с завязывания плодов.	200-250 мл / 100 л воды	1-2 л/га
ПЕРСИК, ВИШНЯ, ЧЕРЕШНЯ, АБРИКОС, НЕКТАРИН, СЛИВА	Применяют 3-4 раза с интервалом 20 дней, начиная с завязывания плодов.	200-250 мл / 100 л воды	1-2 л/га
ВИНОГРАД, БАНАНЫ, ГРАНАТЫ, ИНЖИР	Применяют 3-4 раза с интервалом 20 дней после цветения.	200-250 мл / 100 л воды	1-2 л/га
ЦИТРУСОВЫЕ, ОЛИВКИ, ЧАЙ	Применяют 3-4 раза с интервалом 20 дней после цветения.	200-250 мл / 100 л воды	1-2 л/га
ФУНДУК, ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ, ФИСТАШКИ, КАШТАНЫ	Применяют 3-4 раза с интервалом 20 дней, начиная с завязывания плодов.	200-250 мл / 100 л воды	1-2 л/га
ХЛОПОК, КУКУРУЗА, ПОДСОЛНЕЧНИК, СОЯ, КАНОЛА	Применяют 1-2 раза от стадии 4-5 листьев растений до сбора урожая.	200-250 мл / 100 л воды	1-2 л/га
КАПУСТА, РЕДИС, МОРКОВЬ, СЕЛЬДЕРЕЙ, ЦВЕТНАЯ КАПУСТА	Применяют 1-2 раза от стадии 4-5 листьев растений до сбора урожая.	200-250 мл / 100 л воды	1-2 л/га
ЗЕРНОВЫЕ, БОБОВЫЕ, КОРМОВЫЕ КУЛЬТУРЫ	Применяют 1-2 раза от стадии 4-5 листьев растений до сбора урожая.	200-250 мл / 100 л воды	1-2 л/га
САХАРНАЯ СВЕКЛА, КАРТОФЕЛЬ, ЛУК, ЧЕСНОК	Применяют 1-2 раза от формирования клубней до сбора урожая.	200-250 мл / 100 л воды	1-2 л/га
СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ, ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ, РИСОВЫЕ ПОЛЯ	Применяется 2-3 раза с интервалом 30 дней в период развития.	200-250 мл / 100 л воды	1-2 л/га

РЕКОМЕНДАЦИИ

- ОСТОРОЖНО! ВЫЗЫВАЕТ РАЗДРАЖЕНИЕ!
- Во время внесения удобрений используйте маску, перчатки и очки.
- Никогда не превышайте соответствующие дозы.
- Используйте только при необходимости.
- Хранить вдали от детей и продуктов питания.
- Избегайте попадания в глаза, лицо и кожу. При попадании в глаза и руки промыть большим количеством воды. После использования вымойте руки большим количеством воды и выбросьте использованную пустую упаковку, а не используйте ее вместе с другой упаковкой.
- Рекомендуется использовать удобрения после анализа почвы и/или листьев.



ЕС УДОБРЕНИЯ
СМЕСЬ МИКРОРАСТИТЕЛЬНЫХ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ
БОРА (B) И ЦИНКА (ZN-СУЛЬФАТ)

TETRA ZnB

ГАРАНТИРОВАННЫЙ СОСТАВ	% М/М
Водорастворимый бор (B)	10
Водорастворимый цинк (Zn)	12

РЕКОМЕНДАЦИИ

- ВНИМАНИЕ! Беречь от детей и продуктов питания.
- Прочтите этикетку перед использованием
- Не используйте использованную пустую упаковку для других целей и не уничтожайте ее.
- Используйте защитные перчатки и маску.
- После использования вымойте руки большим количеством воды.
- Не глотать. При проглатывании обратитесь к врачу.
- Избегать попадания на кожу и в глаза, в случае попадания промыть большим количеством воды.
- Рекомендуется использовать удобрения после анализа почвы и/или листьев.



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

НАЗВАНИЕ РАСТЕНИЙ	ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ	ЛИСТВЕННЫЙ ПОЛИВ	КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ
ОВОЩИ: ПОМИДОРЫ, ПЕРЕЦ, БАКЛАЖАНЫ, ФАСОЛЬ, ГОРОХ, КАРТОФЕЛЬ, ЛУК, ЧЕСНОК, ОГУРЕЦ, ДЫНЯ, АРБУЗ, ТЫКВА и т. д. (Все виды открытого и закрытого грунта)	- На ранних стадиях развития растения (завязывание цветов) - От цветения до сбора урожая (2-3 применения)	100-150 гр 100-150 гр	400-500 гр
ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ: МЯГКИЕ И КОСТОЧКОВЫЕ ФРУКТЫ, ВИШНЯ, ПЕРСИКИ, АБРИКОСЫ, СЛИВА, ВИШНЯ, ЯБЛОКО, ГРУША, МИНДАЛЬ, ФУНДУК, ГРАНАТ и т. д.	- Начало цветения, плодоношения 1 применение в период завязывания, развития плодов и окраски	100-150 гр	400-500 гр
ВИНОГРАДСТВО: СТОЛОВЫЙ ВИНОГРАД И ИЗЮМ РАССАДА ДЛЯ ВСЕХ СОРТОВ.	- При росте побегов 3-5 см, в период выхода грозди, перед цветением, на тонких и крупных кустах, в период пресноводного хождения.	100-150 гр	400-500 гр
КЛУБНИКА	В течение сезона	100-150 гр	400-500 гр
ХЛОПОК	- от периода с 6-8 листьями до сбора урожая	100-150 гр	400-500 гр
ТЕПЛИЧНЫЕ И СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ	- На протяжении всего периода развития	100-150 гр	400-500 гр
САЛАТ-ЛАТУК, ПЕТРУШКА, КРЕСС- САЛАТ, РУКОЛА и т. д. (Зеленые растения)	- На протяжении всего периода развития	100-150 гр	400-500 гр
ПОЛЕВЫЕ КУЛЬТУРЫ: ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС, РИС и т. д.	2 применения с интервалом 10 дней в период кущения.	100-150 гр	400-500 гр
ОЛИВКОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ	- Начало цветения, плодоношения Вплоть до периода завязывания и окрашивания, в течение всего летнего периода.	100-150 гр	400-500 гр
ЦИТРУСОВЫЕ	- Период цветения, период завязывания плодов и до сбора урожая.	100-150 гр	400-500 гр
ТАБАК	- 3 применения в период рассады, от посадки до периода прореживания.	100-150 гр	400-500 гр
ПРОМЫШЛЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ: САХАРНАЯ СВЕКЛА, АНИС, КУКУРУЗА, ПОДСОЛНЕЧНИК и т. д.	- Минимум 2 применения в период раннего развития	100-150 гр	400-500 гр
НУТ	- Минимум 2 применения в начале цветения	100-150 гр	400-500 гр

ЕС УДОБРЕНИЯ
РАСТВОР УДОБРЕНИЙ NK

NATUREFERT

ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ
ЖИДКОЕ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ С NK

AQUA POTASOL

ГАРАНТИРОВАННЫЙ СОСТАВ	% М/М			
	18-18-18	15-30-15	5-5-40	16-8-24
Общий азот (N)	18	15	5	16
Мочевина Азот (N)	11,5	8	-	11
Аммонийный азот (NH ₄ -2)	6,5	7	5	5
Водорастворимый пентаоксид фосфора (P ₂ O ₅)	18	30	5	8
Водорастворимый оксид калия (K ₂ O)	18	15	40	24
Водорастворимая медь (Cu)	0,03	0,02	0,03	0,02
Водорастворимое железо (Fe)	0,05	0,05	0,05	0,05
Водорастворимый марганец (Mn)	0,05	0,05	0,05	0,05
Водорастворимый молибден (Mo)	0,001	0,001	0,001	0,001
Водорастворимый цинк (Zn)	0,05	0,05	0,05	0,05

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Может применяться капельно или внекорневым способом в течение вегетационного периода в зависимости от потребностей растений.
- Смешивается с другими препаратами для подкормки растений и пестицидами, за исключением бордосской суспензии и щелочных пестицидов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

НАЗВАНИЕ РАСТЕНИЙ	ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ	ВНЕКОРНЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ мл/100 л воды/га	ВНЕСЕНИЕ В ПОЧВУ л/га
ТОМАТ, БАКЛАЖАН, ПЕРЕЦ И Т. Д.	- В рассад (2 применения), - В период роста	50-80 80-100	0,8-1 л 0,8-1 л
ДЫНЯ, АРБУЗ, ОГУРЕЦ И Т. Д. (ТЫКВА)	- В период раннего развития - До появления первой воды - В начале развития рукава - В период плодоношения	100-120 100-120 100-120 100-120	0,8-1 л 0,8-1 л 0,8-1 л 0,8-1 л
ВИШНЯ, ПЕРСИК, ЯБЛОНЯ, ГРУША, АБРИКОС, СЛИВА, НЕКТАРИН, ГРАНАТ И Т. Д. на лиственных деревьях	- Сразу после посева - Когда открываются глазки - После цветения или при появлении первых плодов - В период созревания плодов - После сбора фруктов	150-250 150-250 150-250 150-250 150-250	10-15 мл на саженец 3-5 лет 15-25 мл 5-10 лет 25-40 мл на дерево 10 лет и старше 40-50 мл на дерево 40-50 мл на дерево
ВИНОГРАДНИК	- Сразу после посева - Когда открываются глазки - Перед цветением - В период коррозии - После сбора урожая	150-250 150-250 100-200 100-200 100-200	5 кубиков на новый корешок 5-8 кубиков на унцию урожая 0,8-1 л из капельницы 0,8-1 л от капельного полива 0,8-1 л от капельного полива
ОПИВКИ	- Сразу после посева - Перед цветением - В летний период	200-250 200-250 200-250	В июне 1-3 или 15-20 мл на дерево 3-6 деревьев 15-25 мл 25-40 мл на 6-12 деревьев 40-50 мл на 12 и более деревьев
ХЛОПОК	- Когда появляется 8-10 листьев (только на рядах растений) - Период до распускания и цветения - Период первого кокона	150-200 150-200 100-150	
ЦИТРУСОВЫЕ	- До цветения - После цветения - Июнь Перед поливом - Сразу после сбора урожая	150-200 150-200 150-200 200-250	На одно дерево 1-5 лет 10-15 мл 4-8 лет 15-25 мл 8-15 лет 25-40 мл 40-50 мл старше 15 лет
КАРТОФЕЛЬ при первом внесении воды в почву ее дают из расчета 1 литр на 5 декалитров	- Период первого выпуска - До первой воды - В начале цветения - После цветения	150-200 150-200 150-200 150-200	Доза для семян 100 литров воды на 2 тонны семян помещается 100-150 кубиков и вносятся. Опрыскиванием вносят 100-200 мл на декар.
КАПУСТА, ЦВЕТНАЯ КАПУСТА, БРОККОЛИ, БРЮССЕЛЬСКАЯ КАПУСТА, КАПУСТА И САЛАТ-ЛАТУК	- После 15-20 дней в период раннего развития (делается 2-3 завязки)	150-200 150-200	При посадке саженцев их окунают в 100 л воды с объемом 100-150 мл и высаживают. На один декалитр приходится 0,8-1 л почвы.
КЛУБНИКА	- В конце зимнего периода - До и после цветения - С интервалом в 15 дней во время сбора урожая	100-150 100-150 100-150	0,8-1 л/га 2 применения
СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ	- Роза, в начале периода бодрствования - Прорастание почек - С интервалом в 20 дней в течение периода развития	150-200 100-150 100-150	0,8-1 л/га 3-4 применения
ТЕПЛИЦЫ	- 2 приложения в периоды разработки	150-200	Вносить 0,8-1 л 2-3 раза на 1000 м ² в теплице методом дождевания. Поливать чистой водой сверху.





ЕС УДОБРЕНИЯ

EXECAL

7-0-21+(11CaO)

ГАРАНТИРОВАННЫЙ СОСТАВ	% M/M
Общий азот (N)	7
Нитратный азот (N)	7
Водорастворимый оксид калия (K ₂ O)	21
Водорастворимый оксид кальция (CaO)	11
Содержание хлора (Cl)	% 12,9



ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ
ЖИДКАЯ СМЕСЬ ПИТАТЕЛЬНЫХ МИКРОРАСТЕНИЙ
Медь (оксид Cu), марганец (оксид Mn) и цинк (оксид Zn)

TRİFECT

ГАРАНТИРОВАННЫЙ СОСТАВ	% M/M
Всего Медь (Cu)	8,5
Всего марганца (Mn)	11,5
Всего цинка (Zn)	8,5

БЕЗ ХЛОРА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

НАЗВАНИЕ РАСТЕНИЙ	СПОСОБ И ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	ПОЧВЕННЫЙ ПОЛИВ
ПОМИДОРЫ, ПЕРЕЦ, АРБУЗ, МОРКОВЬ, КЛУБНИКА, ДЫНЯ	Каждые 15-25 дней с момента формирования первых плодов.	2-3 л/га
ЦИТРУСОВЫЕ	Каждые 15-25 дней с момента формирования первых плодов.	2-3 л/га
ЯБЛОКО, СЛИВА, ПЕРСИК, АБРИКОС, ФУНДУК	Каждые 15-25 дней с момента формирования первых плодов.	2-3 л/га
КАРТОФЕЛЬ, ЛУК, МОРКОВЬ, РЕДИС, САХАРНАЯ СВЕКЛА	2-3 применения, начиная со стадии 4-5 листьев	2-3 л/га
АРАХИС, СОЕВЫЕ БОБЫ, ФАСОЛЬ, ФАСОЛЬ и т. д.	2-3 применения, начиная до цветения	1-2 л/га
ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ и т. д.	В период братьев и сестер	1-2 л/га
СЛАДКАЯ КУКУРУЗА	Завод находится на стадии возведения	1-2 л/га
ОЛИВКОВОЕ	Во время формирования первых плодов, пока семена затвердевают	2-3 л/га
КОРМОВЫЕ КУЛЬТУРЫ, КЛЕВЕР	При достижении растениями 15 см и после сбора урожая	2-3 л/га
ХЛОПОК	Apple стартует перед заземлением	1-2 л/га
ВИНОГРАДНИК	2-3 применения после цветения	2-3 л/га

Следует соблюдать осторожность при использовании его на чувствительных к хлору растениях.


ВНИМАНИЕ

- Держите вдали от детей и продуктов питания. Во время внесения удобрений используйте маску, перчатки и очки.
- Никогда не превышайте соответствующую дозировку и используйте только при необходимости.
- Избегайте попадания в глаза, на лицо и на кожу. В случае попадания промыть большим количеством воды.
- Утилизируйте использованные пустые упаковки и не используйте их для других целей.
- Рекомендуется использовать удобрения после анализа почвы и/или листьев.



ВНИМАНИЕ

- Держите вдали от детей и продуктов питания. Во время внесения удобрений используйте маску, перчатки и очки.
- Никогда не превышайте соответствующую дозировку и используйте только при необходимости.
- Избегайте попадания в глаза, на лицо и на кожу. В случае попадания промыть большим количеством воды.
- Утилизируйте использованные пустые упаковки и не используйте их для других целей.
- Рекомендуется использовать удобрения после анализа почвы и/или листьев.



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

НАЗВАНИЕ РАСТЕНИЙ	СПОСОБ И ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ	ПОЧВЕННЫЙ ПОЛИВ
ПОМИДОРЫ, ПЕРЕЦ, АРБУЗ, МОРКОВЬ, КЛУБНИКА, ДЫНЯ	Каждые 15-25 дней с момента формирования первых плодов.	1 л/га
ЦИТРУСОВЫЕ	Каждые 15-25 дней с момента формирования первых плодов.	1 л/га
ЯБЛОКО, СЛИВА, ПЕРСИК, АБРИКОС, ФУНДУК	Каждые 15-25 дней с момента формирования первых плодов.	1 л/га
КАРТОФЕЛЬ, ЛУК, МОРКОВЬ, РЕДИС, САХАРНАЯ СВЕКЛА	2-3 применения, начиная со стадии 4-5 листьев	1 л/га
АРАХИС, СОЕВЫЕ БОБЫ, ФАСОЛЬ, ФАСОЛЬ и т. д.	2-3 применения, начиная до цветения	1 - 1,5 л/га
ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ и т. д.	В период братьев и сестер	1 - 1,5 л/га
СЛАДКАЯ КУКУРУЗА	Завод находится на стадии возведения	1 - 1,5 л/га
ОЛИВКОВОЕ	Во время формирования первых плодов, пока семена затвердевают	1-2 л/га
КОРМОВЫЕ КУЛЬТУРЫ, КЛЕВЕР	При достижении растениями 15 см и после сбора урожая	1-2 л/га
ХЛОПОК	Apple стартует перед заземлением	1-2 л/га
ВИНОГРАДНИК	2-3 применения после цветения	1 л/га

FULLTECH

ГАРАНТИРОВАННЫЙ СОСТАВ	% М/М
Органическое вещество	40
Органический углерод	20
Общий азот (N)	2
Водорастворимый оксид калия (K ₂ O)	4
pH	4,1-6,1

НАЗВАНИЕ РАСТЕНИЙ	ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ	ВНЕКОРНЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ мл/100 л воды/га	ВНЕСЕНИЕ В ПОЧВУ л/га
ТОМАТ, БАКЛАЖАН, ПЕРЕЦ и т.д.	- В рассадку (2 применения), - В период роста	50-80 80-100	0,8-1 л 0,8-1 л
ДЫНЯ, АРБУЗ, ОГУРЕЦ и т.д. (ТЫКВА)	- В период раннего развития - До появления первой воды - В начале развития рукава - В период плодоношения	100-120 100-120 100-120 100-120	0,8-1 л 0,8-1 л 0,8-1 л 0,8-1 л
ВИШНЯ, ПЕРСИК, ЯБЛОНА, ГРУША, АБРИКОС, СЛИВА, НЕКТАРИН, ГРАНАТ и т.д. на листопадных деревьях	- Сразу после посева - Когда открываются глаза - После цветения или при появлении первых плодов - В период созревания плодов - После сбора фруктов	150-250 150-250 150-250 150-250 150-250	10-15 мл на саженец 3-5 лет 15-25 мл 5-10 лет 25-40 мл на дерево 10 лет и старше 40-50 мл на дерево 40-50 мл на дерево
ВИНОГРАДНИК	- Сразу после посева - Когда открываются глаза - Перед цветением - В период коррозии - После сбора урожая	150-250 150-250 100-200 100-200 100-200	5 кубиков на новый корешок 5-8 кубиков на унцию урожая 0,8-1 л из цветелицы 0,8-1 л от капельного полива 0,8-1 л от капельного полива
ОЛИВКИ	- Сразу после посева - Перед цветением - В летний период	200-250 200-250 200-250	1-3 или 15-20 мл на дерево 3-6 деревьев 15-25 мл 25-40 мл на 6-12 деревьев 40-50 мл на 12 и более деревьев
ХЛОПОК	- Когда появится 8-10 листьев (только на ридках растений) - Период до распускания и цветения - Период первого кокона	150-200 150-200 100-150	
ЦИТРУСОВЫЕ	- До цветения - После цветения - Июнь. Перед поливом - Сразу после сбора урожая	150-200 150-200 150-200 200-250	На одно дерево 1-5 лет 10-15 мл 4-8 лет 15-25 мл 8-15 лет 25-40 мл 40-50 мл старше 15 лет
КАРТОФЕЛЬ при первом внесении воды в почву ее дают из расчета 1 литр на 5 декалитров	- Период первого выпуска - До первой воды - В начале цветения - После цветения	150-200 150-200 150-200 150-200	Доза для семян 100 литров воды на 2 тонны семян помещается 100-150 кубиков и вносятся. Опрыскиванием вносит 100-200 мл на декар.
КАПУСТА, ЦВЕТНАЯ КАПУСТА, БРОККОЛИ, БРЮССЕЛЬСКАЯ КАПУСТА, КАПУСТА и САЛАТ-ЛАТУХ	- После 15-20 дней в период раннего развития (делается 2-3 заправки)	150-200 150-200	При посадке саженцев их окунают в 100 л воды с объемом 100-150 мл и высаживают. На один декалитр приходится 0,8-1 л почвы.
КЛУБНИКА	- В конце зимнего периода - До и после цветения - С интервалом в 15 дней во время сбора урожая	100-150 100-150 100-150	0,8-1 л/га 2 применения
СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ	- Рема, в начале периода поддерживания - Прорастание почек - С интервалом в 20 дней в течение периода развития	150-200 100-150 100-150	0,8-1 л/га 3-4 применения
ТЕПЛИЦЫ	- 2 приложения в периоды разработки	150-200	Вносить 0,8-1 л 2-3 раза на 1000 м ² в теплице методом дождевания. Поливать чистой водой сверху.

- ВНИМАНИЕ! Бережёт от детей и продуктов питания.
- Прочтите этикетку перед использованием
- Не используйте использованную пустую упаковку для других целей и не уничтожайте ее.
- Используйте защитные перчатки и маску.
- После использования вымойте руки большим количеством воды.
- Не глотать. При проглатывании обратитесь к врачу.
- Избегать попадания на кожу и в глаза, в случае попадания промыть большим количеством воды.
- Рекомендуется использовать удобрения после анализа почвы и/или листьев.





Newagri Kimya Tarım Ür. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Aşağıoba Mh. S.S. Toptancılar Birliği Sitesi
128 Ada B Blok No: 2 Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0 242 257 0 444 Fax: 0 242 221 24 00
info@newagri.com.tr • www.newagri.com.tr